

«Этот документ был разработан при финансовой поддержке Программы приграничного сотрудничества Эстония-Латвия-Россия в рамках Европейского Инструмента Соседства и Партнерства 2007-2013. Содержание данного документа является предметом ответственности исключительно Тартуский Центр Экологического Образования и ни в коей мере не является отражением позиции Программы, а также участвующих в Программе стран и Европейского Союза».

«Программа приграничного сотрудничества Эстония-Латвия-Россия в рамках Европейского Инструмента Соседства и Партнерства 2007-2013 предоставляет финансирование для развития совместной приграничной деятельности в целях повышения конкурентоспособности региона за счет использования его потенциала и благоприятного положения на перекрёстке путей между Европейским Союзом и Российской Федерацией.

Веб-сайт Программы www.estlatrus.eu.»

ЗАМЕЧАЙ ПРИРОДУ!

Подборка Тартуских деревьев и кустарников

	Высота	Побеги	Время цветения	Время созревания плодов
ВЫСОКИЕ ДЕРЕВЬЯ				
Клён остролистный – <i>Acer platanoides</i>	до 30 м	От красновато-коричневых до желтовато-коричневых	Май	Созревают в сентябре, осыпаются до середины декабря
Ясень обыкновенный – <i>Fraxinus excelsior</i>	20 – 25 м	Зеленовато-серые, с беловатыми чечевичками	Май	Созревают в октябре, осыпаются до весны
Конский каштан обыкновенный – <i>Aesculus hippocastanum</i>	до 25 м	Коричневые, со светлыми овальными чечевичками	Май	Созревают в сентябре, сразу осыпаются
НИЗКИЕ ДЕРЕВЬЯ				
Клён ясенелистный – <i>Acer negundo</i>	до 15 м	Зелёные или синевато-зелёные, с "изморозью".	Конец апреля – май, двудомный	Созревают в октябре, остаются до весны
КУСТАРНИКИ				
Бузина красная – <i>Sambucus racemosa</i>	до 4 м	От коричневых до серых, с шишковатыми чечевичками коры	Май	Созревают в августе, быстро съедаются птицами
Чубушник венечный – <i>Philadelphus coronarius</i>	1,5 – 3 м	Коричневые, тоненькие и хрупкие	Июнь	Созревают в сентябре – октябре, остаются до весны
Сирень обыкновенная – <i>Syringa vulgaris</i>	до 6 м	Серовато-коричневые, голые, с маленькими чечевичками	Июнь	Созревают в сентябре – октябре, остаются до весны
ВЫСОКИЕ ДЕРЕВЬЯ				
Дуб обыкновенный – <i>Quercus robur</i>	более 20 м	Коричневые, видны шишковатые устьица	Май	Созревают в сентябре, осыпаются в сентябре – октябре
Тополь – <i>Populus</i>	25 – 30 м	От желтоватых до коричневых, блестящие	Апрель – май, двудомный	Созревают в июне – июле, осыпаются в июле
Берёза повислая – <i>Betula pendula</i>	более 25 м	Коричневые, с шероховатыми железистыми пятнами, иногда гладкие	Апрель – май	Созревают с конца июля, осыпаются в августе
Берёза пушистая – <i>Betula pubescens</i>	18 – 23 м	Серовато-коричневые, ворсистые или гладкие	Апрель – май	Созревают с конца июля, осыпаются в августе
Липа сердцевидная – <i>Tilia cordata</i>	25 – 30 м	От красновато-коричневых до желтовато-зелёных	Июль	Созревают в сентябре – октябре, остаются на дереве и зимой
Вяз шершавый – <i>Ulmus glabra</i>	24 – 30 м	Коричневые, толстые, зигзагообразные, ворсистые	Конец апреля	Созревают в начале июня, осыпаются к концу июня
Ольха серая – <i>Alnus incana</i>	15 – 25 м	Серовато-коричневые, с чечевичками, коротковорсистые	Март	Созревают в октябре, осыпаются зимой
НИЗКИЕ ДЕРЕВЬЯ ИЛИ ВЫСОКИЕ КУСТАРНИКИ				
Лещина обыкновенная – <i>Corylus avellana</i>	5 – 10 м	Коричневые, с железистыми волосками	Апрель	Созревают в сентябре
Черёмуха обыкновенная – <i>Padus avium</i>	до 10 м	Блестящие коричневые, с чечевичками, кора при трении имеет сильный запах	Май	Созревают к концу сентября, быстро съедаются птицами
Рябина обыкновенная – <i>Sorbus aucuparia</i>	12 – 20 м	Серовато-коричневые, покрыты прозрачной пленкой	Май	Созревают к середине августа, с удовольствием съедаются птицами
семейство боярышниковые – <i>Crataegus</i>	5 – 8 м	Колючки 4-6 см в длину, молодые ветви красновато-коричневые, старые серые	Май – июнь	Созревают в сентябре, съедаются птицами зимой
КУСТАРНИКИ				
семейство спирея – <i>Spiraea</i>	0,5 – 2 м	Кора на ветвях шелушится, ростки извилистые и ворсистые	Май – сентябрь	Созревают в августе – октябре, остаются на кустарниках и зимой
семейство кизильник – <i>Cotoneaster</i>	0,5 – 2 м	Ростки ворсистые, у верхушки войлочные	Июнь	Созревают в сентябре, осыпаются в сентябре – ноябре
семейство шиповник – <i>Rosa</i>	0,5 – 5 м	Ростки с шипами, от зеленоватых до коричневых	Июнь – сентябрь	Созревают в сентябре, остаются на кустарниках и зимой
Барбарис обыкновенный – <i>Berberis vulgaris</i>	2 – 3 м	На серых ветвях светло-коричневые тройные колючки 1-2 см в длину. На молодых ростках колючки одиночные, ростки сами желтоватые или желтовато-коричневые	Май – июнь	Созревают в сентябре, остаются на кустарниках до начала зимы
Смородина альпийская – <i>Ribes alpinum</i>	1 – 2 м	Стебли серые, ветки постарше коричневые	Май – июнь, двудомный	Созревают в июле, быстро съедаются птицами



Tartu
Keskkonnahariduse
Keskus

united by borders



